

RYM® Quemaduras

Crema para uso cutáneo

Descripción del producto:

RYM® Quemaduras es un preparado tópico constituido por ácido hialurónico como componente principal. El ácido hialurónico es un polisacárido biológico (glicosaminoglicano) distribuido en la matriz extracelular de la mayoría de los tejidos. Según varios estudios, el ácido hialurónico participa en los procesos de reparación de muchos y diversos tejidos facilitando la cicatrización y reepitelización. Gracias a sus propiedades hidrofílicas, proporciona un medio hidratado entre las células, facilitando su migración. Proporciona un medio hidratado idóneo para la curación de las heridas. La sulfadiazina argéntica es un agente conocido por su acción antimicrobiana inhibiendo el crecimiento in vitro de casi todas las bacterias y hongos patógenos. La presencia de sulfadiazina argéntica desempeña un papel fundamental en la prevención de la contaminación microbiana, mejorando así la capacidad cicatrizante del ácido hialurónico. Esta característica permite cambiar el vendaje una vez al día y, por tanto, disminuye las molestias para el paciente y la exposición de la lesión al aire reduciendo así la posibilidad de contaminación de la herida.

Composición:

Componente principal: ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2 %.

Otros componentes: sulfadiazina argéntica 1 %, monoestearato de polietilenglicol 400, éster decílico del ácido oleico, cera emulgente, glicerol, solución de sorbitol al 70 %, agua purificada.

Indicaciones:

RYM® Quemaduras está indicado para el tratamiento de las lesiones cutáneas, especialmente aquellas con riesgo de infección. En particular se ha desarrollado para cubrir heridas tanto agudas como crónicas (quemaduras de primer y segundo grado, úlceras vasculares y metabólicas y llagas por decúbito), proporcionando un medio hidratado libre de microbios.

RYM® Quemaduras puede utilizarse en heridas no infectadas para prevenir su infección y, después del tratamiento de una herida infectada, para ayudar a prevenir la reaparición de la infección.

Posología y administración:

Limpiar y desinfectar las heridas o las úlceras antes del tratamiento. Aplicar una fina capa de crema sobre la superficie de la herida una o dos veces al día en función de la gravedad de la quemadura hasta su completa curación. Los tratamientos de más de un mes deberán ser establecidos por un facultativo según la evolución de la herida. El área tratada debe cubrirse con un apósito estéril.

Contraindicaciones:

No administrar a pacientes con una determinada hipersensibilidad conocida a los componentes del producto, pacientes con insuficiencia hepática o renal o deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

No administrar a mujeres embarazadas ni a los bebés.

Advertencias y precauciones:

No usar si el paquete está dañado.

No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

La fecha de caducidad se refiere al producto mantenido en su envase original y conservado a temperatura inferior a 30 °C.

Desechar después de 12 meses desde la primera apertura.
Después de usar, depositar en el contenedor de residuos apropiado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto directo del envase con la herida.

Cada tubo de **RYM® Quemaduras** debe ser usado únicamente por un paciente con el fin de reducir el riesgo de infección cruzada.

Evite la exposición de las áreas tratadas a la luz solar, ya que la sulfadiazina argéntica puede manchar la piel. Sin embargo, cualquier tinción producida puede ser fácilmente eliminada lavando la zona teñida.

Interacciones:

No usar concomitantemente con desinfectantes que contengan sales de amonio cuaternario o enzimas proteolíticos aplicados localmente, ya que pueden interactuar con el producto.

Reacciones adversas:

RYM® Quemaduras generalmente es bien tolerado. Cuando se tratan zonas extensas del cuerpo pueden producirse reacciones adversas que son a veces observadas después de la administración sistémica de sulfonamidas, como fallo renal, hepatitis tóxica, agranulocitosis, trombocitopenia o leucopenia.

Conservación:

Conservar a una temperatura inferior a 30 °C.

No congelar.

Presentación:

Estuche conteniendo un tubo de 25 g de crema.

Estuche conteniendo un tubo de 100 g de crema.

Fabricado por:

FIDIA Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 Abano Terme (Padua), Italia

Distribuido en España por:

LABORATORIOS ERN, S.A.

Perú, 228

08020 Barcelona, España

Fecha de publicación de la última revisión de las instrucciones de uso: Marzo 2016



Plazo después de la primera apertura



No utilizar si el envase está dañado



Consúltense las instrucciones de uso



Fecha de caducidad



Límite de temperatura



Código de lote



Fabricante

CE 0459

ERN