RYM® Cicatrizante

ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2%

Crema para **uso cutáneo**

Descripción del producto:
RYM® Cicatrizante es un preparado tópico constituido por ácido hialurónico como componente principal. El ácido hialurónico es un polisacárido biológico (glicosaminoglicano) distribuido en la matriz extracelular de la mayoría de los tejidos. Gracias a sus propiedades hidrofílicas, proporciona un medio hidratado entre las células, facilitando su migración.

Composición:
Componente principal: ácido hialurónico (sal sódica) al 0,2 %.
Otros componentes: monoestearato de polietilenglicol 400, éster decílico del ácido oleico, cera emulgente, glicerol, solución de sorbitol al 70 %, dehidroacetato sódico, metil p-hidroxibenzoato, propil p-hidroxibenzoato, fragancia, ácido láctico, agua purificada.

Indicaciones:
RYM® Cicatrizante está indicado para el tratamiento de las irritaciones y las lesiones cutáneas. Se ha desarrollado especialmente para cubrir heridas agudas (heridas resultantes de intervenciones quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado y zonas de las que se ha extirpado tejido para realizar un injerto) y heridas crónicas (úlceras vasculares y metabólicas y llagas por decúbito).

Posología y administración:
Limpiar y desinfectar las heridas o las úlceras antes del tratamiento. Aplicar una fina capa de crema sobre la superficie de la herida, dos o tres veces al día durante un máximo de 30 días consecutivos.
El área tratada debe cubrirse con un apósito estéril.

Contraindicaciones:
No administrar a pacientes con una hipersensibilidad conocida a los componentes del producto.

Advertencias y precauciones:
Uso exclusivamente externo.
No usar si el paquete está dañado.
No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
La fecha de caducidad se refiere al producto conservado en su envase original y a una temperatura inferior a 30 C.
Desechar el producto 12 meses después de la primera apertura.
Evitar el contacto directo del envase con la herida.
Cada tubo de **RYM® Cicatrizante** debe ser usado únicamente por un paciente con el fin de reducir el riesgo de infección cruzada.
En caso de embarazo, lactancia y uso en niños, consulte a su médico antes de usar el producto, ya que no se ha establecido la seguridad y eficacia de **RYM® Cicatrizante** en estos casos.
Después de usar, depositar en el contenedor de residuos apropiado.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Reacciones adversas:
Pueden producirse ocasionalmente reacciones cutáneas como: erupción en el lugar de aplicación, prurito, ardor, irritación de la piel, sequedad, eritema, dermatitis, decoloración de la piel.
Puede ocurrir un efecto transitorio de sabor metálico (disgeusia) con una incidencia muy baja y podría estar relacionado con condiciones médicas preexistentes de los pacientes.
Los síntomas son habitualmente transitorios, leves y rara vez requieren abandonar el tratamiento.

Interacciones:
No usar concomitantemente con desinfectantes que contengan sales de amonio cuaternario, ya que el ácido hialurónico puede precipitar en su presencia. El tratamiento tópico concomitante de las heridas con antibióticos u otros agentes de acción a nivel local nunca ha originado interacciones o incompatibilidades con RYM® Cicatrizante.

Conservación:
Conservar a una temperatura inferior a 30 C.

Presentación:
Envase con tubo de 25 g de crema.
Envase con tubo de 100 g de crema.

Fabricado por:
Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padua), Italia

Distribuido en España por:
LABORATORIOS ERN, S.A.
Perú, 228
08020 Barcelona, España

Fecha de publicación de la última revisión de las instrucciones de uso: Noviembre 2020

Consúltense las instrucciones de uso

Fecha de caducidad

Código de lote

Plazo después de la apertura

No utilizar si el envase está dañado

Fabricante

610370/G

CE 0123