RYM® Nasal Gel

Gel nasal hidratante a base de Hydeal-D® 0,2 %

Información sobre el producto
La mucosa nasal desempeña un papel sumamente importante en la respiración, ya que se encarga de la filtración, la humidificación y el calentamiento del aire inhalado. Para llevar a cabo estas funciones de manera correcta, es necesario que la mucosa esté recubierta por una fina película acuosa que la mantenga hidratada, a pesar del paso de aire que tiende a resecarla.
Y es aquí donde cobra importancia la función fisiológica del ácido hialurónico: cuando es segregado por determinadas células de la mucosa, se estratifica y absorbe una gran cantidad de líquidos exudados, formando así una película protectora que favorece la hidratación y el funcionamiento normal de la mucosa, además de desempeñar un papel clave en los procesos de reparación tisular.

RYM® Nasal Gel es un gel incoloro que, gracias a la presencia de Hydeal-D® (derivado del ácido hialurónico), hidrata la mucosa nasal.
Por ello, **RYM® Nasal Gel** es un complemento adecuado para restablecer las funciones naturales de la película líquida que recubre la mucosa nasal y para favorecer los procesos naturales de reparación.

Composición
Ingrediente principal: Hydeal-D® 0,2 % (derivado del ácido hialurónico)
Otros ingredientes: propilenglicol, carbómero, parahidroxibenzoato de metilo, parahidroxibenzoato de propilo, dehidroacetato de sodio, aceite de ricino hidrogenado polioxilado 40, aceite de menta, hidróxido de sodio, agua purificada.

Uso previsto
RYM® Nasal Gel se utiliza para hidratar la mucosa nasal y proporcionar un entorno húmedo óptimo que favorezca los procesos naturales de curación.

Indicaciones
RYM® Nasal Gel está indicado para tratar la sequedad de la mucosa nasal y los síntomas relacionados (p. ej., costras, picor, ardor y obstrucción nasal), incluyendo posibles microlesiones de la mucosa asociadas.

Población destinataria
Este producto se utiliza como autotratamiento en pacientes con sequedad nasal de origen diverso.

Usuarios previstos
Este producto está destinado para el autotratamiento por personas no expertas; no está específicamente dirigido a usuarios especializados.

Posología y forma de administración
El frasco de **RYM® Nasal Gel** no contiene gases propelentes, por lo que debe prepararse para el uso antes de la primera aplicación. Para ello, sujete el frasco como se muestra en la Fig. 1 y, mientras lo mantiene en posición vertical, presione el dosificador varias veces (5-10) hasta que salga gel; el frasco ya está listo para ser utilizado. No será necesario repetir esta operación antes de las siguientes aplicaciones.


Fig.1


Fig.2


Fig.3


Fig.4

Siga las siguientes instrucciones de uso del producto:
1. Retire el tapón del dosificador sujetando firmemente la base con los dedos, tal como se muestra en la Fig. 2.
2. Introduzca con cuidado la boquilla en una fosa nasal mientras mantiene cerrada la otra fosa (Fig. 3).
3. Pulverice 1 o 2 veces según sea necesario.
4. Saque la boquilla de la fosa nasal.
5. Masajee suavemente la base de la nariz por la parte exterior; esto ayudará a distribuir el gel de manera uniforme por el interior de la fosa nasal (Fig. 4).
6. Repita la operación en la otra fosa nasal.
7. Cuando termine, limpie bien el dosificador y el tapón.
8. Vuelva a colocar el tapón.

Frecuencia de uso
Aplicar el producto 3 o 4 veces al día hasta la resolución de los síntomas, durante un máximo de 30 días consecutivos. Se aconseja respetar la frecuencia de uso indicada.

Uso en poblaciones específicas
En caso de embarazo, lactancia, uso en niños, uso en ancianos, tratamiento combinado o presencia de enfermedades concomitantes (p. ej., afecciones de las vías respiratorias, hemorragia nasal frecuente, broncoespasmo, traumatismo maxilofacial), consulte al médico antes de utilizar el producto, dado que no se ha establecido la seguridad y eficacia de **RYM® Nasal Gel** en estos casos.

Contraindicaciones
No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de los ingredientes del producto.

Advertencias y precauciones
El producto solo es para uso nasal.
Cada frasco de **RYM® Nasal Gel** debe ser utilizado por un solo paciente con el fin de mantener las condiciones de higiene del producto y evitar el riesgo de infección cruzada.
No utilizar el producto después de la fecha de caducidad que figura en la caja exterior y en el frasco.
La fecha de caducidad se refiere al producto conservado correctamente en su envase original. El producto se puede utilizar hasta 6 meses después de la primera aplicación.
No tirar el envase vacío en el medio ambiente; eliminarlo de acuerdo con la normativa nacional aplicable.
Conservar la caja y las instrucciones de uso durante todo el periodo de utilización del producto.
No utilizar el producto si el envase está dañado de forma que se vea comprometida su integridad.
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Reacciones adversas
En general, **RYM® Nasal Gel** se tolera bien. En raras ocasiones pueden aparecer los siguientes efectos secundarios no deseados: dolor de cabeza.

ATENCIÓN: el usuario deberá comunicar cualquier incidente grave relacionado con el producto al fabricante, a través de la dirección de correo electrónico phv@fidiapharma.it, y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Interacciones
El uso concomitante con productos a base de sales de amonio cuaternario (p. ej., cloruro de benzalconio) puede alterar el producto.

En caso de tratamiento combinado y administración concomitante con medicamentos u otros productos, consultar al médico para obtener indicaciones específicas sobre la administración, dado que no se dispone de datos de interacción de **RYM® Nasal Gel** con otras sustancias y/o productos.

Conservación
Conservar entre 2 °C y 25 °C.
No congelar.

Presentación
Caja de cartón que contiene un frasco de 20 g con dosificador en spray y tapón.

Fabricante:
Fidia farmaceutici S.p.A.
via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031 Abano Terme (PD) - Italia

Distribuido en España por:
Laboratorios ERN, S.A.
C/Perú, 228 - 08020 Barcelona, España

CE 0051

Fecha de publicación de la última versión actualizada de las instrucciones de uso: octubre de 2024 (Rev. 01)

	Consúltense las instrucciones de uso
	Fecha de caducidad
	Código de lote
	Número de modelo
	Identificador único de producto
	No utilizar si el envase está dañado
	Límite de temperatura
	Fabricante
	Producto sanitario
	Manténgase alejado del calor
	Meses tras la apertura
	Uso múltiple en un solo paciente
	Sigre
	Distribuidor

A70026I
IST13001209-A

HYDEAL-D® es una marca propiedad de Fidia farmaceutici S.p.a.